



البحث في الموقع ...

Like

85k

Suivre

1



الشاف فايسبوك

الحسين خرجة:
حكروني!!

كيفاش

ديرها غير زوينه... توصل توصل

الفقيه بوصنطحية

في خاطر بسيمة حقاوي
سأالك!!

الرئيسية متابعات بنكيران ووليداتو سؤال جواب السّلطة الرابعة صندوق العجب ناري جابها فراسو للنساء فقط

الخميس 21 مارس 2013

للإشهار حياة التحرير اتصل بنا

في تحد واضح للقانون وتهديد كبير لسلامة النساء.. حركة مالي تقدم نصائح للراغبات في الإجهاض!!

19 فبراير 2013 - 10:56

10

Like

1

Tweet

Share 10

facebook Trouvez des personnes, des lieux ou d'autres choses

الإجهاض الطبي الآمن : عملية الإجهاض عن طريق تناول الحبوب - حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل

1- اشترى 50 Artotec في الصيدلية (100 درهم)
2- وضعي 4 حبات تحت اللسان لمدة 30 دقيقة ثم ادقيلهم
3- انتظري 3 ساعات ثم وضعي 4 حبات من جديد تحت اللسان لمدة 30 دقيقة ثم ادقيلهم
4- انتظري 3 ساعات ثم وضعي 4 حبات الأخيرة تحت اللسان لمدة 30 دقيقة ثم ادقيلهم
5- من المحتمل أن تحسي بالوجع أو التوريشة (الارتجاف) أو ينزل منك بالتقية (القيء)

Avortement Maroc : Plus d'informations, moins de risques.

202 J'aime - 102 personnes en parlent

Commentant Mettons fin aux pratiques clandestines et dangereuses en offrant des moyens d'avortement légaux, contrôlés et sanitaires afin de sauver la vie des femmes.

Photos Welcome Mentions J'aime Vidéos

202

Maintenant Discussion instantanée (OFF)


Find us on Facebook



كيفاش? kifache?

Like

85,976 people like kifache? كيفاش?.



Facebook social plugin

آخر المقالات

الأكثر تعليقا

آخر التعليقات

عاجل.. ماهر زين يهدد بالغاء حفله إن لم يتسلم 40 مليون نقدا



الزايدي لـ كيفاش: ما تصالحناش مع ادريس لشكر.. والعداوة ثابتة والصواب يكون



غضبية قاض بعد إهانة الشرف المغربي.. رجل يتنازل عن متابعة سعودي اغتصب ابنته في مراكش



قالتها الصورة.. الملك في السينغل مع الجالية المغربية



الشوباني بيرر: ها كيفاش تأسست حياة الحوار الوطني حول المجتمع المدني (فيديو)



مجلس الحكومة.. تعيينات في مناصب عليا



أحمد الحاضي

هاد حركة مالي كتقلب على الصداق، غير شي يتعرا، وشي ولي عالم في الدين بلا خبار الزمزمي. كيفاش؟

أنشأت حركة مالي موقعا إلكترونيا، يحيل على صفحتها في فايس بوك، تحت اسم "إجهاض.كوم". المشكل ليس في الموقع في حد ذاته، إذا كان لغرض تحسيس، لكن الصفحة تقدم الطريقة التي يمكن اتباعها من أجل الإجهاض. كما وضعت الحركة رقما هاتفيا لاستقبال مكالمات الراغبات في الإجهاض.

النصائح الموجودة على الصفحة ليست آمنة بما أنها تعتمد على استعمال أدوية يمكن أن يكون لها آثار سينية على مستعملها، في حالة عدم استشارة الطبيب المختص.

وكان الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، عبر عن رفض لما تقوم به حركة مالي في قضية الإجهاض، معتبرا أن محاربة هذه الظاهرة يلزمها وقت ليتفهمها المغاربة.

هاد مالي باينة باغية تسيط الدريات للقبر.

▶ حركة

▶ عند

▶ علاج

▶ الحمل

إعلانات Google

مواضيع أخرى:

الدوري القطري.. الحسين
خرجة يسلم لاعبا برازيل...

قالتها الصورة.. قبله عفوية لولي
العهد وابتسام...

بابا الفاتيكان يستقبل بنكيران..
أش قال رئيس....

تطوان.. سيدة تلد في سيارة
أجرة لعدم وجود أمك...

ملك الأردن: محمد مرسي ليس
لديه أي عمق وأنا لا...

الحسين خرجة: حكروني!!

تعليقات القراء [1]

hamza

19 فبراير 2013 الساعة 11:57

ARTOTE20

فئة العلاجية: مضاد للالتهابات

نشاط المكونات: ديكلوفيناك، ميسوبروستول

علاج الأعراض من الهجمات الحادة لمرضى الروماتيزم في خطر (بما في ذلك السن < 65 سنة، تاريخ القرحة الهضمية أو التعصب لمضادات الالتهابات)، التي علاج مضاد للالتهابات أمر ضروري.

جرعة

طريقة الإدارة:

للكبار (فوق 15 سنة).

شفويا.

يجب ابتلاع أقراص كما هو، مع كوب كامل من الماء.

الجرعة:

الجرعة هي 1 قرص، 2 مرات في اليوم.

تردد الإدارة:

وينقسم إلى قسمين الجرعة جرعة في اليوم، مع وجبات الطعام.

يجب أن مدة العلاج لا تتجاوز 10 يوما.

مؤشرات ضد

بطلان:

- فرط الحساسية لأي من السواغات.

- نظرا لوجود اللاكتوز، لا ينبغي أن تستخدم هذا الدواء في حالات الجالاكتوز في الدم الحلقية، سوء الامتصاص من الجلوكوز وسكر اللبن أو نقص اللاكتاز.

- المحافظون المؤشرات المتعلقة الميزوبروستول:

- فرط الحساسية للبروستاجلاندين.

- الحمل: هذا الدواء مع نشاط قوي على انقباض الرحم، فإنه قد يسبب انقطاع الحمل: دراسات أجريت على الحيوانات لم تظهر تأثير ماسخ ولكن يحدث موت الأجنة في الجرعات العالية. سريريا، هناك حاليا أي بيانات مهمة لتقييم التأثير المحتمل ماسخة

من الميزوبروستول عندما تدار خلال فترة الحمل في سياق صفة طبية عن طريق الفم. ومع ذلك، بعض حالات الحمل تتعرض من خلال التطبيب الذاتي المشار إليها الإجهاض (عن طريق الفم و / أو المهبل) تشير إلى التأثير الضار للاستخدام

الميسوبروستول في ظل هذه الظروف: أطرافه غير طبيعية، والتنقل والجنين الجمجمة hypomimie () ، مص غير طبيعي، والبلع حركات العين). حتى الآن، لم يتم استبعاد احتمال وجود خطر ماسخة. ولذلك، فإن استخدام هذا الدواء هو ضد أضرار-

طوال فترة الحمل. هذا البند ليست حجة منهجية لتقديم المشورة إنهاء الحمل إذا ما تم تناول الميسوبروستول عن غير قصد في وقت مبكر من هذا واحد، ولكن يجب أن تؤدي، في هذا السياق، والتنبيه ورصد فترة ما حول الولادة المنحى (الموجات فوق

الصوتية الأعضاء المستهدفة).

- المرأة في الإنجاب في حالة عدم وجود وسائل منع الحمل فعالية.

المحافظون المؤشرات المتعلقة ديكلوفيناك:

- فرط الحساسية للمواد النشطة ديكلوفيناك ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل ماثلة أخرى، والأسبرين.

- بالموقع مرض القرحة الهضمية.

- عدم كفاية الكبد الحاد.

- القصور الكلوي الحاد.

- فشل القلب الحاد، غير المنضبط.

المحافظون المؤشرات المتعلقة زيت الخروع:

- انسداد معوي.

الموصى بها:

- الرضاعة (المتعلقة ديكلوفيناك): مضادات الالتهابات التي تمر عبر حليب الثدي، كإجراء وقائي، يجب تجنب المرأة في إدارة التمرين.

- لا ينصح تركيبات: مضادات التخثر عن طريق الفم، مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى (بما في ذلك الساليسيلات في الجرعات العالية)، والليثيوم، الميثوتريكسات (تستخدم بجرعات أكبر من 15 ملغ / الأسبوع).

معاكس

RELATED ديكلوفيناك:

- الجهاز الهضمي:

. من غير المؤلف: في بداية العلاج، والغثيان، والتقيؤ، والإسهال، وتشنجات في البطن، ألم، وسوء الهضم، وفقدان الشهية، التجشؤ.

. نادر: القرحة الهضمية، أو انثقاب الزيف المعوي. هذه هي أكثر شيوعا من الجرعة المستخدمة هي عالية.

. حالات معزولة: انخفاض اضطرابات البطن مثل التهاب القولون غير محدد من تفاقم التهاب القولون التقرحي. تم الإبلاغ عن

التهاب البنكرياس، وحالات الإمساك.

تأثيرات بالبشرة :-

. عزل الحالات من فقدان الشعر، وردود الفعل للضوء.

. نادرة جدا حدوث الجلادات الفقاعي (متلازمة ستيفنز جونسون، انحلال البشرة السمي) واحمرار الجلد.

- تفاعلات فرط الحساسية:

. الطفح الجلدي، وخلايا النحل، والأكزيما.

. الجهاز التنفسي: تشنج قصبي، التهاب رئوي فرط الحساسية.

. الأخرى: حالات التهاب الأوعية الدموية بما في ذلك المعزولة من حساسية فرقية، نقص ضغط الدم.

. العلام: نادر جدا الحساسية / ردود الفعل تأقاني بما في ذلك المرضى الذين يعانون من حساسية من الأسبرين.

- تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي:

. من غير المؤلف: الصداع، والدوخة أو النوار.

. نادر: النعاس.

. عزل الحالات: المضبوطات، والتهاب السحايا العقيم. تم الإبلاغ عن اضطرابات نوع الأرق، والتهيج، والتعب، ورعاش.

المعزولة حالات الاضطرابات الحسية: تشوش الحس، اضطرابات بصرية (عدم وضوح الرؤية، شفح)، وطنين.

- التأثيرات على الكلى:

. نادر: وذمة الطرفية.

. حالات معزولة: الفشل الكلوي الحاد، تشوهات البولية (بيلة دموية، بيلة بروتينية)، التهاب الكلية الخلال، المتلازمة الكلوية،

نخر حليمي، فرط بوتاسيوم الدم من hyporéninisme.

- التأثيرات على الكبد:

. من غير المؤلف: الترانسميناسات المصل زيادة.

. نادرة: التهاب الكبد مع أو بدون يرقان.

. التهاب الكبد مداهم الحالات المعزولة.

- التأثيرات على الدم:

نادرة جدا: قلة الكريات البيض، ندرة المحببات، قلة الصفيحات مع أو بدون فرقية، فقر الدم اللاتنسجي، وفقر الدم الانحلالي.

RELATED الميزوبروستول:

- الجهاز الهضمي:

الاسهال الخفيف، والغثيان (خفيفة وعابرة)، ألم في البطن.

- التأثيرات على الجهاز العصبي المركزي:

الصداع، والدوخة.

- التأثيرات على الجهاز التناسلي:

أكثر نادرا، اضطرابات الدورة الشهرية، وتشنج الرحم والنزيف المهبل بعد سن اليأس.

زيت الخروع ذات صلة:

الجهاز الهضمي:

الغثيان والقيء وآلام في البطن.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها *
 تنبيه: التعليقات المنشورة في موقع "كيفاش.كوم" تعبر عن آراء أصحابها فحسب. وكل تعليق أساء إلى الأشخاص، أو هاجم الأديان، أو مس بالمقدسات، أو دعا إلى التحريض العنصري، سيحذف دون حاجة إلى تبرير.

الاسم

البريد الإلكتروني

الموقع

تعليق

إضافة تعليق